

# චිකුන්ගුන්යා වළක්වා ගැනීම



## සිඹේ ප්‍රදේශයේ චිකුන්ගුන්යා රෝගය ශික්‍රයෙන් පැතිර යන බව සිඹ දන්නවා ද ?

- චිකුන්ගුන්යා වෛරසයක් මගින් ඇතිකරන අතර මදුරුවන් මගින් පැතිරෙයි
- තද උණට අමතරව හිසරදය, ශරීරයේ තදබල වේදනාව, හන්දිපත් වේදනාව, ඉදිමීම සහ ශරීරයේ පළ ඇතිවීම වැනි රෝග ලක්ෂණ මෙහිදී දැකිය හැක.
- හන්දිපත් ඉදිමීම සහ වේදනාව සමහර විට රෝගය සුවවී මාස කිහිපයක් යනතුරුත් පැවතිය හැක.

## පැතිරීම වැළැක්වීමට හැකි වනුයේ

• මදුරුවන් බෝවන ස්ථාන ඉවත් කිරීමෙන් හා විනාශ කර දැමීමෙන් පමණි.

## ඝෑක සහිත වෛරස උණ රෝගයක් වැළඳුනහොත්

- දින තුනකට වඩා උණ පවතී නම් වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා ගන්න
- සතියක් වත් විවේක ගන්න
- දියර වර්ග වැඩිපුර පානය කරන්න
- උණ සඳහා පැරසිටමෝල් අඩංගු ඖෂධයක් නියමිත මාත්‍රාවට අනුව ගන්න
- පෝෂ්‍යදායී ආහාර හා පළතුරු වැඩියෙන් ගැනීමෙන් ශරීරයේ ප්‍රතිශක්තිය වැඩි කර ගන්න
- වැඩි විස්තර සඳහා ප්‍රදේශයේ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී හෝ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක අමතන්න

## වැඩි වශයෙන් මදුරුවන් බෝවන ස්ථාන

- ඉවතලන නොදිරන ද්‍රව්‍ය
  - වයර්
  - ටින්
  - පිගන් හා පෝසිලේන් කොටස්
  - ප්ලාස්ටික් කෝප්ප
  - බෝතල්
  - කිරි හට්ටි

- ඉවතලන දිරාපත් වන ද්‍රව්‍ය
  - පොළකටු
  - පළතුරු වල කටු කැබලි (බෙලි, දිවුල් වැනි)
  - බිත්තර කටු

- වැසි ජලය රැඳී තිබිය හැකි ස්ථාන
  - අවහිර වී ඇති වැහි පිලි
  - අවහිර වී ඇති සිමෙන්ති කාණු
  - ජලය රැඳී ඇති කොන්ක්‍රීට් වහල

- ආවරණය නොකළ ජලය රැස් කරන ස්ථාන
  - සිමෙන්ති වැංකි
  - බැරල්
  - බුලි
  - මුවටි / කළ
  - ප්ලාස්ටික් වැංකි
  - බාල්දි
  - පීප්ප
  - කල්දේරම්

- විසිතුරු භාණ්ඩ හා අනෙකුත් ස්ථාන
  - පක්ෂි නාන තටාක
  - මාළුන් රහිත වැංකි
  - කුහුඹු උගුල්
  - පොකුණු
  - මල් බඳුන්
  - ශීතකරණ තැටි

- ශාක හා ශාක කොටස්
  - පත්‍ර අතර ජලය රැඳෙන විසිතුරු පැළ
  - ගස් බෙන
  - කැපූ උණ පුරුක්

